

## Para el Control de Ratas y Ratones a la Intemperie y/o Areas Húmedas, en Cultivos, Instalaciones Agrícolas e Instalaciones Pecuarias.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Clasificación Química	Rodenticida Anticoagulante de Segunda Generación
Ingrediente activo / Número de CAS	Brodifacoum / 56073-10-0
Concentración del activo en el producto terminado	0.05 gramos por kilogramo (0.005%)
Amargante (prevención de ingestión accidental)	Benzoato de Denatonio
Tipo de formulación	Mini Bloque Parafinado de extrusión
Presentaciones	1. Bolsa de 20 gramos 2. Tarro de 1 Kilogramo 3. Caja de 10 kilogramos
Categoría toxicológica	IV
Registro MAGA	799-3



### MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN SOBRE LAS PLAGAS

Actúa por ingestión. Bloquea el mecanismo de coagulación de la sangre e incrementa la permeabilidad de los capilares, lo cual ocasiona hemorragias internas que causan la muerte de los roedores a los 3 a 5 días después de la ingestión del cebo, evitando que estos identifiquen al rodenticida como el agente causal. De esta forma toda la población de roedores ingiere el cebo, consiguiéndose un excelente control.

**PLAGAS QUE CONTROLA Rata negra o del tejado:  
Rata gris, noruega o de alcantarilla:**

*Rattus rattus*  
*Rattus norvegicus*

**Ratón casero: *Mus musculus*  
Rata de campo: *Sigmodon hispidus***

### RECOMENDACIONES PREVIAS AL MANEJO DE CEBOS RODENTICIDAS

Por razones de seguridad y para evitar la impregnación de olor humano en los cebos (los roedores no comen cebos con olor humano), utilice guantes de hule o de nitrilo al manipularlos.

### EQUIPOS RECOMENDADOS

Este producto se aplica en forma manual. Al voleo o postura específica en puntos de cebaje, según sea el caso.

### DOSIS RECOMENDADAS

Para el control de ratas y ratones: Aplique de 1 a 3 Kilogramos por Hectárea, cuando las condiciones requieran aplicación al voleo. De 1 a 3 mini bloques por postura, cuando las condiciones requieran aplicación por puntos de cebaje.

### COMPATIBILIDAD

Roefin® 0.005 BB, Mini bloque parafinado debe utilizarse solo.

### FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Coloque los cebos cada vez que se observe presencia de roedores o señales frescas de heces, orina o daños ocasionados por ellos. Revise los cebos cada 4 a 7 días y reponga los que hayan sido consumidos. Los cebos no consumidos deben cambiarse cuando se observen en mal estado (presencia de hongos, orinados, defecados, cubiertos de tierra, etc.)

### PERÍODO DE REINGRESO

Se puede reingresar a las áreas tratadas inmediatamente después de la aplicación.

**PARA INFORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA PARA SU EMPRESA SOBRE EL USO Y MANEJO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, AVÓQUESE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE HIGIENE, PROTECCIÓN Y MEDIO AMBIENTE.**

### FABRICANTE

ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE, S.p.A.  
Via Terza Strada no. 12 (Z.I.)  
35026 Conselve, Padova.  
ITALIA

