

Programa sugerido para prevención de enfermedades en ganado

Edad	Vacuna	Observaciones
1 semana	NEUMOBAC	En zonas de alta incidencia de diarreas y enfermedades pulmonares repetir a las 3 semanas para reforzar defensas. Aplicación Intramuscular o Subcutánea 2 ml./animal.
2 meses	BOVIBAC PLUS O BOVIBAC PLUS 12	Dosis 5 ml./animal, aplicar Intramuscular o Subcutánea. Si la madre no ha sido tratada con Bovivac Plus o Bovivac plus 12 repetir de nuevo después de 3 ó 4 semanas para reforzar defensas.
	RAYOVET	Dosis 2 ml./animal, aplicar Intramuscular o Subcutánea.
4 meses	BRUCCELL-VET	Aplicar 5 ml x animal solo en hembras que se dedicarán a la crianza.
5 meses	CLOSTRIVET B	Dosis 5 ml./animal, aplicar Intramuscular o Subcutánea.
6 meses	BOVIBAC PLUS O BOVIBAC PLUS 12, CLOSTRIVET B Y RAYOVET	Bovibac Plus o Bovibac Plus 12 y Clostrivet colocar 5 ml./animal, Rayovet colocar 2ml./animal vía Intramuscular o Subcutánea. Si se aplican el mismo día poner una en cada lado del animal con diferente vacunador y equipo. Agite el producto antes y durante la aplicación.
Repetir cada 6 meses	BOVIBAC PLUS O BOVIBAC PLUS 12, CLOSTRIVET B Y RAYOVET	Bovibac plus o bovibac plus 12 y Clostrivet colocar 5 ml./animal, Rayovet colocar 2ml./animal vía Intramuscular o Subcutánea. Si se aplican el mismo día poner una en cada lado del animal con diferente vacunador y equipo. Agite el producto antes y durante la aplicación.

Observaciones y sugerencias generales:

1. En animales de crianza aplicar a las hembras gestantes 5 ml de NEUMOBAC en el último tercio de gestación. Así se transmitirá la inmunidad a la cría a través del calostro. Asegurarse que los terneros tomen calostro (leche materna) en las primeras horas de nacido.
2. Las vacunas Lavet para Bovinos (excepto la Brucell-vet) pueden utilizarse en forma INTRAMUSCULAR O SUBCUTANEA. Las vacunas contienen en su formula MODIVET (modulador de liberación controlada) que permite que la vacuna se absorba lentamente, estimulando mejor la inmunidad.
3. Si Vitamina o Desparasita lo ideal es hacerlo 15 días antes de la vacunación para dar mayor vigor al animal, así obtendrá mejores resultados.
4. En zonas de alta incidencia de Rabia Bovina, aplicar de acuerdo a las recomendaciones de su MEDICO VETERINARIO y/o respectivo fabricante.
5. Recomendamos comprar VACUNAS LAVET con un Mayorista o Representante Autorizado, contamos con una red de mayoristas en todo el país altamente calificados en el manejo adecuado de la cadena fría y almacenaje, así como en las recomendaciones de uso de los productos LAVET.
6. Las vacunas LAVET deben ser almacenadas y transportadas en temperaturas dentro del rango de los 2 a los 8 grados centígrados. Si le consta o duda que su vacuna estuvo expuesta a congelación o al contrario a altas temperaturas, ESTA VACUNA NO DEBE UTILIZARSE habrá perdido sus propiedades.
7. Todas las vacunas LAVET están identificadas con número de lote y fecha de fabricación/vencimiento, antes de usarlas verificar la fecha de vigencia.
8. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso de cada uno de los productos recomendados, cualquier duda puede consultar con nuestro departamento de Asistencia Técnica al PBX 2506-2222 o al correo serviciocliente@grupolavet.com, más información de nuestros productos www.grupolavet.com.
9. Estos programas y sugerencias son elaborados en base a los avances tecnológicos de fabricación y formulación de nuestras vacunas, son autorizados y revisados constantemente. Sin embargo el programa debe ajustarse de acuerdo al criterio de su MEDICO VETERINARIO y a la prevalencia e incidencia de enfermedades, el manejo específico y la ubicación geográfica de las explotaciones.