

Programas sugeridos por Grupo Lavet para la prevención de enfermedades en aves

Pavos

Edad en semanas	Enfermedades	Vacunas LAVET	Vía administración
1	Newcastle	Newcastle cepa B1 o Lasota	Ocular
	Viruela Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala
2	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular
3 a 4	New Castle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular
	Newcastle	Newcastle Cepa Lasota	Ocular
5	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular
	Viruela Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala
6	Newcastle y Bronquitis o Newcastle, Colera y Coriza	Emulvac NB o Emulvac 3	Subcutánea o Intramuscular
8	Newcastle y Bronquitis o Newcastle, Colera y Coriza	Emulvac NB o Emulvac 3	Subcutánea o Intramuscular
	Viruela Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala
10	New Castle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular
	Viruela Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala

OBSERVACIONES: Revacunar contra NEWCASTLE y VIRUELA AVIAR cada 2 o 3 meses dependiendo del área y la densidad. La Vacuna Emulvac 3 debe ser aplicada en aquellos lugares donde se presenta síntomas de estas 3 enfermedades.

Pollo de Engorde

Edad en días	Enfermedades	Vacunas LAVET	Vía de administración
5 a 7	Newcastle	Newcastle Cepa B1 o Newcastle Cepa Lasota	Ocular
10 a 12	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular
21 a 24	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular o en el agua de bebida
25 a 26	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular o en el agua de bebida

Pollitas en Crecimiento (levante)

Edad en semanas	Enfermedades	Vacunas LAVET	Vía de administración
1	Newcastle	Newcastle Cepa B1 o Newcastle cepa Lasota	Ocular
2	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Newcastle Cepa Lasota o Duovet	Ocular
3 a 4	Newcastle o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular
5 a 6	Newcastle o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular
	Viruela Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala
7 a 8	Newcastle y Bronquitis o Newcastle, Colera y Coriza	Emulvac NB o Emulvac 3	Subcutánea o Intramuscular
9 a 10	Newcastle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular
11 a 12	Newcastle, Colera y Coriza	Emulvac NB o Emulvac 3	Subcutánea o Intramuscular
	Viruela Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala
14	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Newcastle Cepa Lasota o Duovet	Ocular o en el agua de bebida
16 a 17	Newcastle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular o en el agua de bebida

OBSERVACIONES: Revacunar contra la enfermedad de NEWCASTLE después de la 14 a 16 semanas cada 2 meses dependiendo de los niveles de anticuerpos detectados por la prueba de H.I.



Programas sugeridos por Grupo Lavet para la prevención de enfermedades en aves

Gallos de Pelea

Edad en semanas	Enfermedades	Vacunas LAVET	Vía de administración
1	Newcastle	Newcastle Cepa B1 o Newcastle Cepa Lasota	Ocular
2	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular
3 a 4	Newcastle o Newcastle y Bronquitis	Newcastle Cepa Lasota o Doble Aviar	Ocular
5 a 6	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular o en el agua de bebida
	Viruela Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala
7 a 8	Newcastle y Bronquitis o Newcastle, Colera y Coriza	Emulvac NB o Emulvac 3	Subcutánea o Intramuscular
	Newcastle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular
10 a 12	Newcastle y Bronquitis o Newcastle, Colera y Coriza	Emulvac NB o Emulvac 3	Subcutánea o Intramuscular
	Newcastle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular
	Viruela Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala
14 a 16	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar ó Duovet	Ocular o en el agua de bebida
	Newcastle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular o en el agua de bebida

OBSERVACIONES: Revacunar contra NEWCASTLE cada 2 ó 3 meses dependiendo del área y la densidad. La Vacuna Emulvac 3 debe ser aplicada en aquellos lugares donde se presenta síntomas de estas 3 enfermedades.

Aves de Traspatio

Edad en semanas	Enfermedades	Vacunas LAVET	Vía de administración
1	Newcastle	Newcastle Cepa B1 o Newcastle Cepa Lasota	Ocular
2	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular
4	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular o en el agua de bebida
	Viruela Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala
6	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular
8	Newcastle y Bronquitis o Newcastle, Colera y Coriza	Emulvac NB o Emulvac 3	Subcutánea o Intramuscular
	Newcastle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular
	Viruel Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala
10	Newcastle y Bronquitis o Newcastle, Colera y Coriza	Emulvac NB o Emulvac 3	Subcutánea o Intramuscular
	Newcastle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular
12	Newcastle y Bronquitis o Newcastle, Colera y Coriza	Emulvac NB o Emulvac 3	Subcutánea o Intramuscular
	Newcastle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular
	Viruela Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala
14 a 16	Newcastle, Bronquitis y Gumboro ó Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular o en el agua de bebida
	Newcastle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular o en el agua de bebida

OBSERVACIONES: Revacunar contra DOBLE AVIAR cada 2 meses dependiendo del área y la densidad. La Vacuna Emulvac 3 debe ser aplicada en aquellos lugares donde se presentan síntomas de estas 3 enfermedades.

Recomendaciones Generales:

1. En todos los casos para obtener una mejor protección es recomendable administrar Polivitamínico **LABIVIT PV** en el agua de bebida 2 días previo a vacunar y continuar por 3 días posteriores. Administrar como mínimo 5 días.
2. **Mantener siempre cuidadosamente la cadena Fría, SOLO** un manejo adecuado y **BUEN USO** de la vacuna proporciona la adecuada protección a sus aves.
3. Los programas de vacunación sugeridos fueron elaborados y revisados con base técnica inmunológica y 37 años de experiencia en campo, por el **Dr. Carlos del Águila Bernasconi M.V.Z. Microbiólogo MSC.**
4. Los programas de vacunación sugeridos, **deben ajustarse de acuerdo a la Prevalencia e Incidencia** de enfermedades, **ubicación geográfica** de las granjas **y las necesidades de manejo de cada Avicultor.**
5. Los resultados del Programa de vacunación pueden variar si se usan vacunas de otras marcas.
6. Consulte siempre a su **Médico Veterinario**, al **Ministerio de Agricultura, Autoridades Sanitarias**, a nuestros **Representantes y Distribuidores** o al Departamento Técnico de **LABORATORIOS LAVET.**